版权声明

本网受著作权人委托，在此严正声明：披露演讲内容目的在于传递交流学术思想，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。未经本网授权，禁止任何媒体、网站或个人在未经本网书面授权的情况下违法转载、摘编、翻录或其它形式使用本网公开披露的演讲内容。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。刊播后如有作品内容、版权和其它问题请联系010-68479567。

戈谢病的诊疗进展

孟岩

中国人民解放军总医院 儿童医学中心 儿内科

目录

- ◆ **溶酶体疾病概述**

- ◆ 戈谢病概述

- ◆ 戈谢病的临床表现

- ◆ 戈谢病的诊断

- ◆ 戈谢病的治疗

未经授权
违者必究

仅供交流，
请勿使用，

溶酶体贮积症的发病机制(Lysosomal Storage Disease, LSDs)

- 由于遗传缺陷导致某个或某类酶的缺陷，底物不能降解进而在体内异常蓄积引起的疾病，包括 > 50 种遗传性疾病
- 不同底物在不同系统（组织）蓄积而引起多种临床表现
- 底物进行性累积会引起组织/器官不可逆的损伤
- 估计影响世界人口的1:7700
- **多数为常染色体隐性遗传病，少数为X连锁遗传病**

进行性智力、活动倒退，或先有一段正常生长发育，然后出现进行性倒退

发育迟滞、共济失调、惊厥、无力的等神经肌肉症状

肝脾肿大、面容粗陋、骨骼异常等

不能解释的肢体疼痛及骨痛

以上症状呈进行性加重

溶酶体贮积症分类

I. 脂质贮积症

(1) 戈谢病

(2) Niemann-Pick病

(3) Fabry病

(4) 球形细胞脑白质营养不良(Krabbe病)

(5) 异染性脑白质营养不良 (MLD)

(6) Farber病

(7) Tay-Sachs病/ Sandhoff病

(= GM2神经节苷脂贮积症)

(8) GM1神经节苷脂贮积症

II. 粘多糖贮积症 (MPS)

(1) I型 (Hurler综合征/Scheie综合征)

(2) II型 (Hunter综合征)

(3) III型 (Sanfillippo病)

(4) IV型 (Morquio综合征)

(5) VI型 (Maroteaux-Lamy 综合征)

(6) VII型 (Sly病)

(7) IX型 透明质酸酶缺乏症

III. 粘脂贮积症 (ML)

(1) 粘脂贮积症II型 (I-细胞疾病)

(2) 粘脂贮积症III型

IV. 庞贝病 (GSDII)

V. 糖蛋白贮积症

(1) 岩藻糖苷贮积症

(2) 甘露糖苷贮积症

(3) 唾液酸贮积症

(4) 半乳糖唾液酸贮积症

VI. 溶酶体膜转运缺陷

(1) 胱氨酸病

(2) 唾液酸贮积病

(3) NCL

(4) Cobalamine转运缺陷

VII. 蛋白酶缺陷

(1) 组织蛋白酶 D 缺乏

(2) 组织蛋白酶 K 缺乏

(3) II-NCL 肽酶

(4) 棕榈酰蛋白硫酯酶

各种溶酶体贮积症的相对患病率

Adapted from Meikle P et al. *JAMA*. 1999;281:249-254.

目录

- ◆ 溶酶体疾病概述
- ◆ **戈谢病概述**
- ◆ 戈谢病的临床表现
- ◆ 戈谢病的诊断
- ◆ 戈谢病的治疗

仅供学术交流，
请勿使用，

未经授权
违者必究

什么是戈谢病(Gaucher disease , GD)

- ◆ **最常见的溶酶体贮积病之一**
- ◆ **常染色体隐性遗传病**
 - ◆ **基因突变致机体 β 葡萄糖脑苷脂酶活性缺乏**
- ◆ **戈谢细胞形成**
 - ◆ **底物—葡萄糖脑苷脂在巨噬细胞溶酶体中贮积**
 - ◆ **靶组织：肝、脾、骨骼及肺，甚至脑**
- ◆ **受累组织器官出现病变**
 - ◆ **常见：肝脾肿大、贫血、PLT减少、骨骼病变**
 - ◆ **少见：淋巴系统、肺、皮肤、眼、肾等组织受累**
 - ◆ **脑部病变仅见于神经病变型(II型及III型GD)**

发病机制

葡萄糖脑苷脂

神经酰胺+葡萄糖

葡萄糖脑苷脂在溶酶体内积聚

- 骨髓**
- 骨髓浸润
 - 血球减少

单核细胞

巨噬细胞

- 脾 (组织巨噬细胞)**
- 巨脾
 - 血球减少
 - 代谢过盛产生疲劳

- 肝 Kupffer细胞 (肝细胞供给)**
- 肝肿大

- 骨(破骨细胞)**
- 缺血性坏死
 - 骨质疏松症
 - 病理性骨折
 - 慢性骨痛

- 肺 肺泡巨噬细胞**

目录

- ◆ 溶酶体疾病概述
- ◆ 戈谢病概述
- ◆ **戈谢病的临床表现**
- ◆ 戈谢病的诊断
- ◆ 戈谢病的治疗

未经授权
违者必究

仅供交流，
请勿使用，

临床分型

	GD I 非神经病变型	GD II 急性神经病变型	GD III 慢性神经病变型
患病率	1/50,000 (泛民族) 1/500 (德系犹太人)	1/100,000 (泛民族)	1/100,000 (泛民族)
发病年龄	任何年龄	婴儿期	儿童期
寿命(岁)	>6	<2	2 ~ 60
原发性神经系统疾病	无	重度	轻度~重度
内脏肿大	轻度~重度	中度~重度	轻度~重度
血液系统异常	中度~重度	重度	轻度~重度
骨骼病变	无~重度	无	无~重度

GDI : 多系统受累

儿童戈谢病患者的临床症状

- ◆ GD I儿童及青少年患儿常有脾肿大，瘀斑/出血倾向/月经过多，生长发育迟缓

神经系统症状

骨髓受累表现

骨髓检查

骨骼病变

骨坏死

病理性骨折

X线病变

骨髓浸润(MRI)

椎骨塌陷

骨质疏松

I 型戈谢病：临床表现的多样性

病情较重的儿童患者

症状较轻的成人患者

无症状的老年患者

我们更应关注儿童患者生长发育

◆ 儿童GD患者的特征性表现

- ◆ 躯体疾病更严重
- ◆ 生长迟缓
- ◆ 发育延迟
- ◆ 骨量峰值降低
- ◆ 表型以神经病变型为主
- ◆ 骨骼疾病患病率更高

儿童GD患者占GD患者的50%

未经授权
违者必究

目录

- ◆ 溶酶体疾病概述
- ◆ 戈谢病概述
- ◆ 戈谢病的临床表现
- ◆ **戈谢病的诊断**
- ◆ 戈谢病的治疗

未经授权
违者必究

仅供学术交流，
请勿使用，

GD的诊断

◆ 初步诊断

- ◆ 临床表现：不明原因的肝脾肿大、贫血、血小板减少、骨痛等
- ◆ 骨髓涂片：戈谢细胞

◆ 确诊

- ◆ 酶：外周血白细胞或皮肤成纤维细胞
 - 葡萄糖脑苷脂酶活性明显降低：常低于正常值的30%（诊断金标准）
 - 检测实验室：北京、上海、广东
 - 干血片法：邮寄简便易行
- ◆ 基因：葡萄糖脑苷脂酶基因突变检测

基因型

	Chinese patients n (%)
Total Patients, N	134
Genotype, n	93
L444P/Rare Allele†	29 (31.2)
Rare Allele†/Rare Allele†	26 (28.0)
Rare Allele†/?‡	14 (15.1)
L444P/L444P	12 (12.9)
L444P/?‡	6 (6.5)

	Global Data n (%)
Total Patients, N	5980
Genotype, n	4233
N370S/N370S	1278 (30.2)
N370S/L444P	645 (15.2)
N370S/Rare Allele†	615 (14.5)
N370S/?‡	409 (9.7)
L444P/L444P	266 (6.3)
N370S/84GG	264 (6.2)
Rare Allele†/Rare Allele†	198 (4.7)
L444P/Rare Allele†	151 (3.6)
N370S/IVS2+1	103 (2.4)

† "Rare Allele" is defined as any known allele which is not N370S, L444P, IVS2+1, D409H, or 84GG.

‡ Results of genotype test did not match any tested mutations.

GD的诊断-基因检测适用范围

◆ 适用于

- ◆ 不便实施酶活性检测的疑似患者的诊断，转运蛋白缺陷的患者
- ◆ 携带者的诊断
- ◆ 高危家庭产前诊断
- ◆ 临床研究，如基因型与表型关系，预后判断等

➤ 相似的表型可有多种基因型，基因型相同者，临床表现、病程及治疗效果不全相同

➤ 基因检测不推荐作为戈谢病诊断的首选方法

由于基因检测的局限性，基因分析未检出突变者不能完全排除诊断

戈谢病的标准诊断流程

目录

- ◆ 溶酶体疾病概述
- ◆ 戈谢病概述
- ◆ 戈谢病的临床表现
- ◆ 戈谢病的诊断
- ◆ **戈谢病的治疗**

未经授权
违者必究

仅供学术交流，
请勿使用，

戈谢病的治疗

- ◆ 戈谢病是进行的消耗性疾病，如果不进行及时治疗，患者容易致残、致死
- ◆ 以往治疗
 - ◆ 对症输血、支持、抗感染
 - ◆ 脾脏切除
 - 可显著改善贫血和血小板减少
 - 但同时加速葡萄糖脑苷脂在骨髓、肝脏、肺脏等器官的蓄积
 - 增加暴发严重感染的机会
- ◆ 特异性治疗（酶替代疗法）
 - ◆ 1989年阿糖脑苷酶（alglucerase）在美国上市，北京儿童医院自1993年率先在国内ERT治疗2例戈谢病
 - ◆ 由于该药从人胎盘中加工提取，副作用较多，1998年DNA重组技术 β -葡萄糖苷酶(注射用伊米苷酶)

回顾性分析：剂量对治疗效果的影响

◆ 研究背景

- ◆ 伊米苷酶的治疗剂量和临床反应之间缺乏数据

◆ 研究目的

- ◆ 观察ICGG中戈谢I型患者伊米苷酶治疗的量效关系

◆ 研究设计

BMD：骨密度

*BMD数据自起始ERT期随访12年

注射用依米苷酶剂量对血液学指标的影响

Emax=maximal effect (最大效应)

T50=half-time to Emax (达到一半最大效应所需的时间)

注射用依米苷酶剂量越大，对贫血和血小板减少的改善越明显！

注射用依米苷酶剂量对肝脾肿大的影响

E_{max} = maximal effect (最大效应)

T_{50} = half time to E_{max} (达到一半最大效应所需的时间)

注射用依米苷酶剂量越大，对肝脾肿大的缩小越明显！

前瞻性分析：注射用依米苷酶剂量对治疗目标的影响

◆ 研究背景

- ◆ 伊米苷酶的治疗剂量和治疗目标缺乏数据

◆ 研究目的

- ◆ 观察戈谢I型患者伊米苷酶治疗剂量治疗目标达标数的量效关系

◆ 研究设计

研究流程

研究结果：每项治疗目标达成情况

相对于首次注射，ERT治疗4年后至少有70%的患者达到全部六项治疗目标！

回顾性分析：注射用依米苷酶剂量对骨密度的影响

◆ 研究背景

- ◆ 伊米苷酶的治疗剂量和骨密度之间缺乏数据

◆ 研究目的

- ◆ 观察戈谢I型患者伊米苷酶治疗与不治疗对骨密度的影响及量效关系

◆ 研究设计

BMD：骨密度

*BMD数据自起始ERT期随访12年

注射用依米苷酶剂量对骨密度的影响

注射用依米苷酶剂量越大，对骨密度提高越明显！

注射用依米苷酶降低骨质疏松的发生率

剂量越大，治疗时间越长，骨质疏松的发生率越低！

回顾性分析：注射用依米苷酶剂量对生活质量的影 响

◆ 研究目的

- ◆ 用SF-36*调查表评估戈谢病等患者的生活质量(QoL)

◆ 研究设计

- ◆ 这是一个观察性横断面研究

- 确诊戈谢病
- 年龄≥12岁
- 有认知能力，能完成调查表填写
- 20例戈谢病 I 型患者
- 1例戈谢病 III 型患者

SF-36调查表：用于12岁及以上人群

接受伊米苷酶
ERT治疗
n=15

未接受ERT
n=6

研究指标：QoL
• SF-36调查表

未经授权
违者必究

注射用依米苷酶明显改善患者的生活质量

SF-36评估	接受ERT	未接受ERT	P值
机体方面			
生理功能	76.3	59.1	< 0.05
生理职能	70.0	41.6	< 0.05
身体疼痛	76.5	47.8	< 0.05
总体健康	71.1	62.5	< 0.05
心理方面			
活力	67.6	56.6	< 0.05
社会功能	70.0	55.2	< 0.05

**接受伊米苷酶治疗的患者生活质量的改善
明显优于未治疗组！**

戈谢病的底物减少疗法

戈谢病中葡萄糖神经酰胺的合成(S)和降解(D)不平衡。

- ◆ 酶替代疗法(ERT) 恢复了降解葡萄糖神经酰胺的能力。
- ◆ 底物减少疗法(SRT)通过降低合成水平来延缓或停止葡萄糖神经酰胺的聚积。

遗传咨询和产前诊断

- ◆ **遗传方式**：常染色体隐性遗传病
- ◆ **再发风险**：患者父母如果再次生育，其子女患病的风险为25%
- ◆ **咨询对象**：生育过戈谢病患者的家庭、亲属；

戈谢病患者

- ◆ **产前诊断**：

在高危孕妇妊娠11~13周左右取胎儿绒毛，或是在妊娠18~22周左右取羊水进行胎儿羊水细胞培养，进行葡萄糖脑苷脂酶活性或DNA基因突变检测。

小 结

- 最近20年，戈谢病的治疗取得了显著的进步，**不再是不治之症**
- 有效治疗（**酶替代治疗等**）的基础是戈谢病的**早期诊断**
- 戈谢病的**综合诊断策略可分为3步**：结合临床症状**初步怀疑**、各科**专业医师**的参与、专业实验室**酶学和基因检测**
- **戈谢病的标准诊断流程**基于综合诊断策略，值得其他LSDs借鉴
- 在戈谢病治疗中，注射用依米苷酶有着明显的剂量-效应关系
- 注射用依米苷酶剂量越高时，患者的治疗效果越明显

仅供交流，
请勿使用，
谢 谢!
未经授权
违者必究