- 版权声明 本网受著作权人委托，在此严正声明：披露演讲内容目的在于传递交流学术思想，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。未经本网授权，禁止任何媒体、网站或个人在未经 本网书面授权的情况下违法转载、摘编、翻录或其它形式使用 本网公开披露的演讲内容。违反上述声明者，本网将追究 其相关法律责任。刊播后如有作品内容、版权和其它问题请 联系010-68479567。

请勿使用

重组人生长激素有效性

的科学实证研究

北京儿童医院

巩纯秀教授

未经授权
仅供交流
请勿使用，违者必究

目录

儿童生长激素缺乏症

特纳综合征

真实世界的数据（特纳综合征）

未经授权

仅供交流

请勿使用，违者必究

GHD儿童中，性别和生长激素剂量对生长发育及生长因子应答的影响：有效性和安全性

0013-7227/02/\$15.00/0
Printed in U.S.A.

The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 87(1):90-98
Copyright © 2002 by The Endocrine Society

Effects of Dose and Gender on the Growth and Growth Factor Response to GH in GH-Deficient Children: Implications for Efficacy and Safety

PINCHAS COHEN, GEORGE M. BRIGHT, ALAN D. ROGOL, ANNE-MARIE KAPPELGAARD, RON G. ROSENFELD, ON BEHALF OF THE AMERICAN NORDITROPIN CLINICAL TRIALS GROUP

Department of Pediatrics (P.C.), University of California Los Angeles, Los Angeles, California 90095; Department of Pediatrics (A.D.R.), University of Virginia, Charlottesville, Virginia 22903; Department of Pediatrics (R.G.R.), Oregon Health & Sciences University, Portland, Oregon 97201; Novo Nordisk (G.M.B.), Princeton, New Jersey 08540; and Novo Nordisk (A.-M.K.), DK2830 Copenhagen, Denmark

GHD：生长激素缺乏症

Cohen P et al. J Clin Endocrinol Metab 2002;87:90-8

研究背景和目的

研究背景

- 青春期前生长激素缺乏症的儿童生长激素治疗的量效反应数据
- 当前生长激素给药方案是基于体重计算，没有根据其它因素(如性别)进行治疗方案优化

研究目的

- 根据生长发育数据和生化指标评价生长激素在GHD儿童治疗中的量效关系，并观察性别和生长激素剂量的关系

GHD : 生长激素缺乏症

研究方法

研究设计

- 患者随机分组，分别接受25，50或100 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{d}$ 的生长激素
- 每三个月评估一次身高、青春期状态和IGF-1及IGFBP-3水平
- 每年进行一次骨龄X射线检查和代谢指标检测

患者

- 青春期前(Tanner分期I期)，骨龄分别为< 8岁的女孩和< 9岁的男孩
- 根据临床表现和生长激素水平诊断为GHD
- 未接受其它增高治疗

统计分析

- 主要结果：2年生长激素治疗后身高和身高SDS变化
- 统计分析方法：使用ANOVA和非配对t检验

ANOVA，方差分析；IGF-I，胰岛素样生长因子-I；
IGFBP-3，胰岛素样生长因子结合蛋白3；GHD：生长激素缺乏症
Cohen P et al. J Clin Endocrinol Metab 2002;87:90-8

诺泽®治疗儿童GHD，在中国批准的剂量是：**25-35 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{d}$** 。
(参考2017年诺泽®中国说明书)

基线特征

基线特征

	GH剂量($\mu\text{g}/\text{kg}/\text{日}$)		
	25	50	100
患者数量(男性/女性)	33(24/9)	37(23/14)	34(24/10)
年龄, 岁	7.8 $\pm$ 2.9	7.8 $\pm$ 3.0	7.7 $\pm$ 2.7
骨龄, 岁	5.1 $\pm$ 2.5	5.2 $\pm$ 2.5	5.6 $\pm$ 2.2
身高 SDS	-3.2 $\pm$ 1.0	-3.0 $\pm$ 0.9	-2.9 $\pm$ 0.6
IGF-I SDS	-2.8 $\pm$ 1.2	-3.4 $\pm$ 3.5	-2.6 $\pm$ 1.3
IGFBP-3 SDS	-2.0 $\pm$ 1.5	-1.8 $\pm$ 1.7	-1.6 $\pm$ 1.2

SDS, 标准差分值; IGF-I, 胰岛素样生长因子-I;
IGFBP-3, 胰岛素样生长因子结合蛋白3
Cohen P et al. J Clin Endocrinol Metab 2002;87:90-8

诺泽®治疗儿童GHD, 在中国批准的剂量是: 25-35 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{d}$.
(参考2017年诺泽®中国说明书)

GH治疗改善HSDS和HVSDS，且呈剂量依赖性

不同剂量的GH对GHD患儿HSDS的作用

不同剂量的GH对GHD患儿HVSDS的作用

GH生长激素; GHD: 生长激素缺乏症;
 HSDS: 身高标准差评分; HVSDS: 身高生长速率标准差
 Cohen P et al. J Clin Endocrinol Metab 2002; 87:90-8

诺泽®治疗儿童GHD，在中国批准的剂量是：**25-35 μ g/kg/d**。
 (参考2017年诺泽®中国说明书)

生长激素升高血清IGF-I和IGFBP-3 SDS呈剂量依赖性

数据为平均值(SD)

SDS, 标准差分值; IGF-I, 胰岛素样生长因子-I;
IGFBP3, 胰岛素样生长因子结合蛋白3
Cohen P et al. J Clin Endocrinol Metab 2002;87:90-8

诺泽®治疗儿童GHD, 在中国批准的剂量是: 25-35µg/kg/d.
(参考2017年诺泽®中国说明书)

性别对生长激素敏感性有差异

男性患者有线性生长激素剂量依赖性；女性患者在50 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{d}$ 时达到平台期

生长激素对空腹血糖及糖化血红蛋白无影响

	治疗12个月后			治疗24个月后		
	(25 μ g/kg/d)	(50 μ g/kg/d)	(100 μ g/kg/d)	(25 μ g/kg/d)	(50 μ g/kg/d)	(100 μ g/kg/d)
空腹血糖 (mg/dl)	83 $\pm$ 15	81 $\pm$ 17	85 $\pm$ 11	87 $\pm$ 17	86 $\pm$ 17	85 $\pm$ 16
空腹胰岛素 (μ U/ml)	9 $\pm$ 6	13 $\pm$ 9	15 $\pm$ 11	13 $\pm$ 8	13 $\pm$ 8	17 $\pm$ 10
HbA1c(%)	5.4 $\pm$ 0.6	5.3 $\pm$ 0.4	5.3 $\pm$ 0.5	5.2 $\pm$ 0.5	5.2 $\pm$ 0.5	5.3 $\pm$ 0.4

除空腹胰岛素外，其他参数在不同剂量、年龄、
治疗时长均无显著性差异

HbA1c: 糖化血红蛋白

Cohen P et al. J Clin Endocrinol Metab 2002;87:90-8

诺泽®治疗儿童GHD，在中国批准的剂量是：25-35 μ g/kg/d.

(参考2017年诺泽®中国说明书)

研究结论

01

- 在生长激素治疗GHD的患儿中，身高增长和血清生长因子水平升高均与剂量呈依赖性

02

03

- 青春期前儿童中，对生长激素敏感性有性别差异

04

- 生长激素治疗对血糖及糖化血红蛋白无影响
- 治疗过程中未发现新发肿瘤、白血病、脊柱侧凸加重、股骨头滑脱，生长激素耐受性好

目录

儿童生长激素缺乏症

特纳综合征

真实世界的数据（特纳综合征）

仅供交流，未经授权
请勿使用，违者必究

3种剂量生长激素和低剂量雌激素长期治疗后，特纳综合征女孩的成年身高研究

Final Height in Girls with Turner Syndrome after Long-Term Growth Hormone Treatment in Three Dosages and Low Dose Estrogens

YVONNE K. VAN PAREREN, SABINE M. P. F. DE MUINCK KEIZER-SCHRAMA, THEO STIJNEN, THEO C. J. SAS, MAARTEN JANSEN, BARTO J. OTTEN, J. J. GERA HOORWEG-NIJMAN, THOMAS VULSMA, WILHELMINA H. STOKVIS-BRANTSMA, CATRIENUS W. ROUWÉ, H. MAARTEN REESER, WILLEM-JAN GERVER, JOS J. GOSEN, CISKA RONGEN-WESTERLAKEN, AND STENVERT L. S. DROP

Department of Pediatrics, Division of Endocrinology, Erasmus University MC/Sophia Children's Hospital (Y.K.v.P., S.M.P.F.d.M.K.-S., T.C.J.S., S.L.S.D.), 3015 GJ Rotterdam, The Netherlands; Department of Epidemiology and Biostatistics, Erasmus University MC (T.S.), 3015 GJ Rotterdam, The Netherlands; Wilhelmina Children's Hospital (M.J.), 3584 EA Utrecht, The Netherlands; Sint Radboud University Hospital (B.J.O.), 6523 GA Nijmegen, The Netherlands; Free University Hospital (J.J.G.H.-N.), 1081 HV Amsterdam, The Netherlands; Academic Medical Center/Emma Children's Hospital (T.V.), 1105 AZ Amsterdam, The Netherlands; Medical University Center (W.H.S.), 2333 ZA Leiden, The Netherlands; Beatrix Children's Hospital (C.W.R.), 9713 GZ Groningen, The Netherlands; Juliana Children's Hospital (H.M.R.), 2566 MJ The Hague, The Netherlands; Academic Hospital (W.J.G.), 6229 HX Maastricht, The Netherlands; Rijnland Hospital (J.J.G.), 2353 GA Leiderdorp, The Netherlands; and Canisius-Wilhelmina Hospital (C.R.-W.), 6532 SZ Nijmegen, The Netherlands

研究背景和目的

研究背景

- 特纳综合征患者最常见临床特征为身材矮小，药理水平以上浓度的治疗可改善患者生长情况
- 特纳综合征的另一个临床特征为缺少自发的青春期发育，需进行雌激素替代治疗

研究目的

- 确定特纳综合征女孩生长激素治疗最佳剂量和起始治疗最佳年龄

研究设计

随机分组

成年身高

生长激素 45 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{d}$

生长激素 45 (第1年) + 67 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{d}$ (第2年及以上)

生长激素 45 (第1年) + 67 (第2年) + 90 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{d}$ (第3年及以上)

生长激素治疗 ≥ 4 年且女孩 ≥ 12 岁后开始雌激素疗法

临床基线特征

基线特征

生长激素剂量 ($\mu\text{g}/\text{kg}/\text{d}$)

	45	67	90
女孩 (N)	19	20	21
年龄, 岁(SD)	6.5 $\pm$ 1.9	6.9 $\pm$ 2.3	6.5 $\pm$ 2.4
骨龄, 岁(SD)	5.9 $\pm$ 2.1	6.2 $\pm$ 2.5	5.8 $\pm$ 2.4
身高SDS*	-2.9 $\pm$ 0.9	-2.7 $\pm$ 0.9	-2.7 $\pm$ 1.0
校正后预测成年身高, † cm	145.7 $\pm$ 5.7	147.2 $\pm$ 4.9	146.6 $\pm$ 5.6
靶身高 (cm)	170.4 $\pm$ 6.6	171.3 $\pm$ 6.0	170.5 $\pm$ 5.6
核型 : ‡45, X; n(%)	16 (84)	19 (95)	16(76)

SD, 标准差; SDS: 标准差评分

诺泽®治疗特纳综合征, 在中国批准剂量是: **50 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{d}$**
(参考2017年诺泽®中国说明书)

van Pareren Y et al. J Clin Endocrinol Metab. 2003 Mar;88(3):1119-25.

生长激素治疗改善特纳综合征患者成年身高

67 与45 µg/kg/d组相比，
成年身高显著增加

- 45 µg/kg/d，平均年龄6.5岁
- 67 µg/kg/d，平均年龄6.9岁
- 90 µg/kg/d，平均年龄6.5岁

身高SDS(参考组为健康荷兰女孩)

SDS：标准差评分
van Pareren Y et al. J Clin Endocrinol Metab 2003;

诺泽®治疗特纳综合征，在中国批准剂量是：**50µg/kg/d**
(参考2017年诺泽®中国说明书)

83%接受生长激素治疗的特纳综合征女孩可达正常成年身高

67µg/kg/d与90µg/kg/d治疗剂量相比无显著差异

van Pareren Y et al. J Clin Endocrinol Metab 200;

Fredriks A et al. Pediatr Res 2000;47:316-23.

诺泽®治疗特纳综合征, 在中国批准剂量是: **50µg/kg/d**

(参考2017年诺泽®中国说明书)

67 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{d}$ 治疗组比未治疗组成年身高约高16cm

诺泽[®]治疗特纳综合征，在中国批准剂量是：**50 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{d}$**
(参考2017年诺泽[®]中国说明书)

在正常的青春期年龄开始给予雌激素治疗

- 口服给予低剂量微粉化雌激素(17 β -雌二醇)
- 给予雌二醇治疗平均年龄为12.7 $\pm$ 0.7岁，以模拟正常青春期发育
- 开始使用雌激素治疗对骨成熟或身高增长速度均无不良影响
- 如生长激素治疗早期开始，正常青春期使用雌激素不影响成年身高

特纳综合征成年身高水平取决于：

-rhGH剂量、起始治疗身高、年龄及治疗第一年HV

生长激素治疗7年期间IGF-I水平

IGF-I, 胰岛素样生长因子-I

诺泽®治疗特纳综合征, 在中国批准剂量是: 50µg/kg/d

(参考2017年诺泽®中国说明书)

特纳综合征女孩对生长激素治疗耐受性好

- 无生长激素相关不良事件
- 治疗耐受性好
- 临床生化指标通常均处于正常范围
- 无儿童出现糖尿病

结论

- 生长激素治疗使多数特纳综合征女孩成年身高恢复正常水平（ $-2SD$ 以上）
- 成年身高改善程度取决于：生长激素剂量、起始治疗时身高和年龄及第一年的身高增长速度
- $67\mu\text{g}/\text{kg}/\text{d}$ 以上rhGH治疗剂量可使特纳综合征女孩成年身高改善更好。 67 与 $45\mu\text{g}/\text{kg}/\text{d}$ 组相比，成年身高显著增加。
- 如小年龄即开始rhGH治疗，即使偏早（12岁）开始诱导青春发育也不会影响成年身高水平的改善程度。

目录

儿童生长激素缺乏症

特纳综合征

真实世界的数据(特纳综合征)

未经授权

仅供交流

请勿使用，违者必究

NordiNet® IOS和ANSWER项目：研究设计

目标

- 评估在日常临床实践中接受生长激素治疗患者的临床结局
- 为患有生长障碍的特殊人群的管理提供参考

*包括以色列和沙特阿拉伯; †包括来自GrowthWin和NordiWin非干预性研究的数据; ‡包括被纳入两项随机对照研究中的患者的数据 ANSWER, American Norditropin® Studies: Web-Enabled Research 美国诺泽®研究: 网络支持的研究; IOS, International Outcome Study 国际结局研究
Høybye C, et al. Clin Epidemiol 2013;5:119-27

研究概览

ANSWER 项目: N=21,186

NordiNet® IOS: N= 20,548

	NordiNet® IOS	ANSWER 项目
研究起始	2006年4月1日	2002年6月24日
研究停止	2016年12月31日	2016年9月30日
参与国家	23	1
参与临床机构	469	207
评估患者人数	20,548	21,186
评估的适应症	GHD, SGA, TS, CRD, ISS, NS, PWS, AGHD	GHD, SGA, TS, ISS, NS, PWS, AGHD

免责声明:

在中国, 诺泽® 注册用于儿童或成人GHD, 和因特纳综合征或慢性肾脏病导致的身材矮小。

诺和诺德不建议在许可的适应症外使用诺泽®。

AGHD, 成人GHD; LPLV, 末例受试者末次随访; CRD, 慢性肾脏病, GHD, 儿童GHD, ISS, 特发性身材矮小; NS, 努南综合征; PWS, Prader-Willi综合征; SGA, 小于胎龄儿; TS, 特纳综合征

Novo Nordisk. Available at: <http://www.novonordisk-trials.com/WebSite/search/TrialDetail.aspx?Command=GetTrialDetail&TrialId=HGH-2149&Index=2>. Accessed: 16 February 2018.

Novo Nordisk. Available at: <http://novonordisk-trials.com/WebSite/search/TrialDetail.aspx?Command=GetTrialDetail&TrialId=GHLIQUID-3676&Index=0>.

Accessed: 16 February 2018.

真实世界数据：TS 患者在ANSWER及IOS项目

分别有20,204、17,995 儿童患者参与了ANSWER 及IOS 项目

	ANSWER	IOS
TS患者数，全分析组	1003	1374
参与有效性评价的TS患者数	577	936
起始治疗的平均年龄，岁(SD)	8.9 ±4.0	8.7 ±3.8
平均基线GH 剂量, mg/kg/天(SD)	0.049 ±0.010	0.043 ±0.012
平均GH 治疗剂量, mg/kg/天(SD)	0.049 ±0.01	0.044 ±0.009
已知GH治疗剂量的平均治疗疗程, 年 (SD)	3.0 ±2.4	4.3 ±2.8
达到NAH的TS患者人数, n (%)	75 (13.0)	189 (20.2)

数字表示为平均数±均值

GH, 生长激素; NAH, 接近成人身高; SD, 标准差; TS, 特纳综合征

NordiNet® IOS NSR, available on www.novonordisk-trials.com, last accessed 11 April 2018

NordiNet[®] IOS:超过半数TS女孩患者生长激素治疗剂量 低于说明书推荐剂量

- TS儿童患者使用诺泽[®]治疗长达7年 (N=771)
- 德国和英国，大多数TS患者接受生长激素治疗的剂量低于指南和欧洲说明书的推荐剂量
- 德国 (p=0.0135)和法国 (p=0.0283)TS患者，基线身高 SDS和生长激素剂量呈反比（越矮的患者接受更高剂量生长激素）

未经授权

诺泽® 治疗的TS患者HSDS随时间增高

- 使用诺泽®治疗4年TS患者的数据 (n=294)
- 随后几年增长缓慢和减量相一致

未经授权

GH平均剂量, mg/kg/day (SD)

Time Point	GH平均剂量, mg/kg/day (SD)
基线	0.048 (0.013)
第1年	0.048 (0.012)
第2年	0.048 (0.012)
第3年	0.047 (0.014)
第4年	0.047 (0.013)

GH平均剂量, mg/kg/day (SD)

Time Point	GH平均剂量, mg/kg/day (SD)
第1年	0.048 (0.012)
第2年	0.048 (0.012)
第3年	0.047 (0.014)
第4年	0.047 (0.013)

ANSWER, American Norditropin® Studies: Web-Enabled Research; GH, growth hormone; HSDS, height standard deviation score; IOS, International Outcome Study; SD, standard deviation; SDS, standard deviation score; SE, standard error; TS, Turner syndrome

2/3的TS患者经4年生长激素治疗后达正常成人身高

影响TS患者HSDS改变的重要因素：

因素：

- 基线低HSDS， $p < 0.0001$
- 尽早治疗， $p < 0.0001$
- 长期治疗， $p < 0.0001$

• 更高平均生长激素剂量， $p = 0.0265$

HSDS <-2, Height SDS below normal range; HSDS >-2, height SDS within normal range
GH, growth hormone; HSDS, height standard deviation score; SDS, standard deviation score; TS, Turner syndrome
Lee PA, et al. Int J Pediatr Endocrinol. 2015;2015:17

总结

- 特纳综合征尽早诊断和治疗，可最大化生长激素治疗的有效性
- 早期治疗，治疗时低HSDS，长期治疗，高剂量生长激素和改善成年终身高相关
- 两项大型观察性研究ANSWER项目和IOS证实了诺泽®在特纳综合征中良好的安全性